中国西北干旱区生态区划

倪 健 郭 柯 刘海江 张新时*

(中国科学院植物研究所植被数量生态学重点实验室, 北京 100093)

摘 要 从国内外生态区划、生态土地分类和生态-生产范式的研究和发展入手,从生态利用的角度出发,在西北干旱区生态区域分异规律的基础上,结合当地的社会经济发展特点,全面完成了西北干旱区的生态区划方案。本着既尊重自然规律又符合可持续发展的生态-生产范式的原则,在西北干旱区的生态区划过程中,主要考虑以下几个方面:气候与巨地形系统、地貌与基质、植被与土壤以及土地利用与产业发展方向;区划方法是以经验判别和地理信息系统(GIS)相结合进行的,过去发表的多种尺度的图件和区划方案均作为分区过程的辅助材料和新区划方案的校正材料;根据气候、巨地形系统、地貌、基质、植被、土壤以及土地利用和产业发展方向等特征,该生态区划的3级分区指标如下:一级分区,主要依据气候和巨地形系统,并充分考虑该高级分区在生态环境建设和产业结构调整中的作用;二级分区,主要根据次级地形和地貌系统以及大尺度植被类型;三级分区,主要依据基质和土壤的差异所造成的局域植被类型的差异,以及其生态-生产范式和将来的发展方向。根据以上区划的原则和指标体系,西北干旱区的生态区划采用3级区划制:生态域(Ecodomain)、生态区(Ecoregion)、生态小区(Ecodistrict),最后将西北干旱区划分为3个生态域、23个生态区和80个生态小区,并利用GIS绘制了1:100万比例尺的西北干旱区生态区划图。西北干旱区生态区划的目的不仅在于发展独特的干旱区生态区划/生态分类的方法和理论体系,建立生态区划的方案和生态-生产范式,更重要的是要运用这些方法、规律和范式来指导当地的生态环境建设和产业结构调整,促进当地的土地资源合理配置,实现西北干旱区的可持续发展。

关键词 西北干旱区 生态区划 生态-生产范式 生态域 生态区 生态小区

ECOLOGICAL REGIONALIZATION OF ARID LANDS IN NORTHWESTERN CHINA

NI Jian GUO Ke LIU Hai-Jiang and ZHANG Xin-Shi*

(Laboratory of Quantitative Vegetation Ecology, Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093, China)

Abstract An ecological regionalization system was developed for the arid lands of northwestern China based on ecological and environmental factors, including climate, large-scale terrain features, landform, geology, vegetation, and soils, in combination with characteristics of social and economic development. The region was stratified into discrete geographical units of uniformity at three levels: Level I, the ecodomain, was based on climate and large-scale terrain features with consideration of the role of higher levels of regionalization and industrial development; Level II, the ecoregion, was based primarily on secondary landform, topography and large-scale vegetation types; and, Level III, the ecodistrict, was based on differences in local vegetation due to differences in geology and soils, as well as its eco-productive paradigm and potential future development. Based on this three-class system, we defined three ecodomains, 23 ecoregions and 80 ecodistricts. An ecoregional map of northwestern arid lands of China was drawn at 1:1 million scale using GIS. The goals of the ecological regionalization classification were not only to develop a unique system of arid land ecological classification, but also to supervise local development and land use management to promote sustainable development of arid lands in northwestern China.

Key words Arid lands, Northwestern China, Ecological regionalization, Eco-productive paradigm, Ecodistrict, Ecodomain, Ecoregion

人类为了认识自然规律、理解自然规律并利用自然规律来管理土地和生态系统以达到可持续发展的目的,需要从生态学或地学的角度对地球上各种

各样的生态系统及其复合体进行分类和区划。所谓的“生态区划(Ecological regionalization)”(Bailey, 1983, 1984, 1985, 1996a, 1998b),是指利用生态系统

的特征以及驱动生态系统变异的诸多环境因素对生态系统复合体进行分类和划分,所得到的分区可以代表功能相似的生态系统的组合(Bailey, 1983),使得土地管理能够从单一资源的管理走向整个生态系统的管理(Bailey, 1998a),以达到为生态监测、生物保育和可持续发展服务的目的(Bailey, 1991)。

目前生态学界和地理学界存在一些概念,接近或等同于“生态区划”,例如“生态土地分类(Ecological land classification)”(Rowe & Sheard, 1981; Wiken, 1986; Sims *et al.*, 1996),“生态分区(Ecological division)”(Schultz, 1995),“生态系统区划(Ecosystem regionalization)”(Bailey, 1984)或“土地分类和生态系统分类(Land classification and ecosystem classification)”(Rowe, 1996),“生物地理气候的生态系统分类(Biogeoclimatic ecosystem classification)”(Pojar *et al.*, 1987),“生态区域分类(Ecoregion classification)”(Bailey, 1989; Bailey & Hogg, 1986),“多尺度生态系统分类(Multi-scale ecosystem classification)”(Bailey, 1987, 1996b),“多水平生态分类(Multilevel ecological classification)”(Hanson & Hargrave, 1996),以及“生态系统制图(Ecosystem mapping)”(Banner *et al.*, 1996)。最近,科学家们把注意力更多地集中在“生态土地分类”上,因为这是一种更加综合的生态区划方法(Wiken, 1986; ECOMAP, 1993; Sims *et al.*, 1996)。

生态土地分类是从生态学的角度来描述和划分陆地表面存在显著差异的地区;每个地区可作为一个离散系统,取决于地质、土地类型、土壤、植被、气候、野生动物和人类因素的相互交叉和相互限制,在每个生态单元里,由单个或多个因子控制;该生态土地分类的方法可应用于不同的空间尺度(Wiken, 1986)。或者说,生态土地分类是为了土地资源管理而划分土地类型、评估生态系统以及生态系统复合体的一种科学尝试(Sims *et al.*, 1996)。简而言之,生态土地分类是包括区划、分类和制图的一个整体系统,它将地表系统层次化使其成为具有独特生态潜势的小区,划分生态类型和绘制生态单元的根据是那些直接或间接影响和控制生态系统结构与功能的生物和环境因子组合,包括气候、地质、水分、土壤、水文和潜在自然群落等(ECOMAP, 1993)。

而生态-生产范式则是针对不同地区的自然生态环境与社会经济发展特点,以贯穿和联系自然-经济过程的生物地球化学循环、生物地球物理过程和生物地球社会经济关系为驱动因素,所建立的以可持续农业与生态保育为目的的、优化的土地覆盖与

土地利用结构和格局(张新时, 2001)。如果说生态区划偏重于认识自然规律,生态分类侧重于理解自然规律,那么,基于生态区划规律和生态分类的生态-生产范式则是着重于利用自然规律来管理和优化土地利用,它更贴近于生产和实践,是指导生态环境建设和促进农业结构调整的依据与保障。

目前国际上有许多基于不同目的和应用到不同尺度的生态分类和区划方案,著名的如全球尺度上的“生命地带分类系统(Life zone classification system)”(Holdridge, 1967),“世界生物地理生物群区(World biogeographical biomes)”(Udvardy, 1975),“世界生态系统(World ecosystems)”(Olson *et al.*, 1985),“生态系统主要类型(Main types of the world ecosystems)”(Matthews, 1983),“大陆生态区域(Continental ecoregions)”(Bailey & Hogg, 1986; Bailey, 1989, 1996a, 1998b),“世界生态区(Ecoregions of the world)”(Bashkin & Bailey, 1993),“世界陆地生态区(Terrestrial ecoregions of the world)”(Olson *et al.*, 2001)和“全球生态地带(Ecozones of the world)”(Schultz, 1995)等,以及洲际、国家和区域尺度上的“加拿大生态区划(The ecological regionalization in Canada)”(Wiken, 1986; Wiken *et al.*, 1993),“加拿大和美国的生态区域(The ecoregion of Canada and the United States)”(Bailey *et al.*, 1985; Bailey, 1989, 1998a),“美国生态区(Ecoregions of the United States)”(Bailey, 1980)和“美国生态分类与制图(Ecological classification and mapping)”(ECOMAP, 1993)。

自 20 世纪 50 年代以来,我国在大尺度生态系统区划方面不断发展和进步,中国及其特殊区域的生态区划方案和生物群区分类系统得到了很好的建立和应用(Ni, 1985; 黄秉维, 1989a; 倪健等, 1998; 倪健, 2001; Ni, 2001)。简而言之,我国的区划可以分为两种类型,一是生物群区/生态系统分类,如中国植被图(侯学煜等, 1982),植被区划(中国植被编辑委员会, 1980),自然生态区(侯学煜, 1988a, 1988b),生物多样性的生物群区方案(倪健等, 1998),以及基于植物功能型(Plant functional types, PFTs)和生态诊断模型的生物群区分类(Ni, 2001);另一种是自然地理区划,如全国的综合自然地理分区/区划(黄秉维, 1959, 1989b),中国综合自然地理区划新方案(赵松乔, 1983),中国综合自然区划纲要(全国农业自然资源调查和农业区划委员会, 1980),中国自然地理纲要(任美镔, 1979),中国生态区划(傅伯杰等, 2001)和中国生态地域系统(杨勤业等, 2002)以及特殊目

的的景观区划(李万,1982)和农业气候区划(丘宝剑和卢其尧,1987)等。

西部大开发是我国目前的一项基本国策,其重点是生态环境建设和产业结构调整,因此,迫切需要制订生态环境建设和农业结构调整的可持续生态-生产范式,以保证和促进西部大开发的可持续发展(张新时,2001)。西北干旱区是我国西部大开发的关键地区,其地理范围广阔,面积约占全国总面积的四分之一;从行政区划来看,主要包括新疆全境、甘肃河西地区、青海柴达木盆地、内蒙古和宁夏两区中、西部地区;从地形地貌来看,包括昆仑山脉、阿尔金山脉和祁连山脉以北(大约 35°N),贺兰山脉和阴山山脉以西(大约 107°E)的广阔地区。该区域的自然环境与我国其它地区,如东部平原和中部山地森林区、北部高原草地区以及青藏高原高寒植被区截然不同,而表现以极端干旱、高山与盆地相间。

新中国成立的 50 多年来,我国科学工作者对西北干旱区进行了多学科、多方位、多层次的大量研究,在地理、地质、生态、农业、畜牧业等诸多领域取得了许多研究成果,并应用于实际生产中。该地区的区划工作也涉及到诸多方面,早期的如气候区划和植被区划(中国科学院新疆综合考察队和中国科学院植物研究所,1978),近期的如生态功能区划¹⁾等,然而,关于西北干旱区这一独特干旱环境的综合生态区划或自然地理区划,尤其是这一地区的生态-生产范式的工作则较为薄弱。

本文从生态利用的角度出发,在西北干旱区生态区域分异规律的基础上,结合当地的社会经济发展特点,对该地区进行生态区划。西北干旱区生态区划的目的不仅在于发展独特的干旱区生态区划/生态分类的方法和理论体系,建立生态区划的方案和生态-生产范式,更重要的是要运用这些方法、规律和范式来指导当地的生态环境建设和产业结构调整,促进当地的土地资源合理配置,实现西北干旱区的可持续发展。

1 西北干旱区生态区划的原则、方法与指标体系

1.1 生态区划原则

作为区域性的生态区划,又是一个非常特殊地区的生态区划,我们本着既尊重自然规律又符合可

持续发展的生态-生产范式的原则,在西北干旱区的生态区划过程中,主要考虑以下几个方面:

1.1.1 气候与巨地形系统

由大气环流决定的气候结合以区域性的巨地形等级系统是本生态区划最基本与决定性的因素与原则,它们构成了整个区划的大背景。气候,主要是温度与降水,是决定地表生物群区(Biome)或地带性植被分布的基本要素,而巨大的山系与盆地则在很大程度上影响大气环流系统与气候,以及地貌、基质和地表水文过程等景观系统的重要生态要素,因此,可将气候与巨地形相结合来划分区划的高级单位。

西部干旱区地形的基本轮廓是由一系列著名的高大山脉、若干大型盆地、剥蚀低山与高原组成。山脊线平均高度达 6 000 m 的昆仑山和喀喇昆仑山位于干旱区的南缘和西南缘,与青藏高原结合为一体,西缘是帕米尔高原和准噶尔西部山地,北缘西段为阿尔泰山,贺兰山和阴山余脉狼山镇守干旱区东端,东北部是蒙古高原,天山和阿尔金山-祁连山横贯中央,并分别与阿尔泰山和昆仑山交汇,天山东段内部断陷形成了低于海平面 154 m 的吐鲁番-哈密盆地,天山西段分叉形成向西开放的伊犁谷地,由此,干旱区被山地分隔成准噶尔盆地、塔里木盆地、阿拉善高原和柴达木盆地等几个区域。每个区域都具有山地-洪冲积扇-盆地沙漠(或戈壁)的基本地形系统,即山盆系统(张新时,2001)。

天山为西北干旱区新疆境内气候带划分的重要分界线。天山主脊以北地区属于中温带,包括准噶尔盆地及其周边山地和伊犁谷地,平原地区的年平均温度一般不足 10 ℃;天山主脊以南的新疆广大地区属于暖温带范围,包括塔里木盆地和吐鲁番-哈密盆地及其周边山地,平原地区的年平均温度一般在 10 ℃ 以上。阿拉善高原和河西走廊因海拔略高和纬度偏北,温度明显低于塔里木盆地,除了疏勒河谷温度稍高外,平原地区的年平均温度一般不足 10 ℃,与准噶尔盆地相近,也属于中温带的范围。柴达木盆地虽然位于暖温带的纬度范围内,但在自然地理综合区划上通常作为青藏高原的一部分,是高原内部的干旱湖盆,因海拔较高而温度偏低,特别是夏半年的温度偏低,盆地底部年平均温度一般不足 5 ℃。

西北干旱区降雨稀少,而且区域的差异比较大。

1) Administration of Environmental Protection of Xinjiang Autonomous Region (新疆维吾尔自治区环境保护局)(2002). *Ecological Function Regionalization of Xinjiang (Draft)* (新疆生态功能区划(征求意见稿)). Administration of Environmental Protection of Xinjiang Autonomous Region, Urumqi, 195. (in Chinese)

平原地区的年降雨量基本都在 200 mm 以下,吐鲁番盆地、塔里木盆地、柴达木盆地和阿拉善北部降雨量不足 50 mm 的地方占整个西北干旱区约一半的面积。相对而言,北疆准噶尔盆地的降雨量较多,大部分地区的降雨量都在 100 mm 以上,仅古尔班通古特沙漠和艾比湖周围地区的年降雨量略少于 100 mm。然而,山地的降雨量要丰富的多,通常迎风坡的雨水量由基部开始随着海拔的上升而增加,而且,山地地势抬升越快,雨量增加的梯度往往也越大。但是,由于有效水汽含量随高度递减的缘故,低海拔处大气被山地抬升后所产生的效果比高海拔处的要大,由此,到一定的海拔高度后雨量可能不再增加,甚至可能减少,从而在山地中部形成一个或多个最高雨量带(郑度,1999)。

1.1.2 地貌与基质

在气候与巨地形的控制下,地貌的分异造成了地区气候的再分异与主导生态因子的再分配以及地表地质的组成,如:沙、砾、石、壤、粘、黄土、盐层等的梯度变化所造成的不同生态条件,都足以形成植被或生态系统类型的差异。

西北干旱区地形地貌空间格局的典型模式是山地-倾斜平原-冲积平原-沙漠-湖盆,被称为山盆系统。山地又可进一步划分出高山、中山、低山带,倾斜平原又可以划分出洪积扇中上部和扇缘带,冲积平原则可以划分为砾质土、壤质土、沙漠、湖泊等区域(朱宗元等,2000;张新时,2001)。这个特征在北山以西的新疆境内准噶尔盆地、塔里木盆地、吐鲁番-哈密盆地和柴达木盆地表现得尤为明显,完全是四周山地、中间沙漠湖盆的结构。在北山以东、贺兰山以西和祁连山以北地区,国境内的地势总体北倾,由于低山较多,分隔出多片沙漠和居延海等多个低洼地区,又由于多西北风等原因,地表物质由西北向东南呈现出砾石戈壁、沙漠和少量黄土依次分布的现象。

1.1.3 植被与土壤

地带性的与某些非地带性的植被与土壤类型反映着一定的生态系统及其生产力,而生态系统的净第一性生产力(Net primary productivity, NPP)又与气候的水热条件有着密切的相关性,是地区生产潜力与生态区划的重要指标。

在植被的水平分异规律方面,以塔里木盆地东南部、柴达木盆地和河西西部为干旱核心,向四周趋湿,植被由高等植物很少生长的剥蚀低山石漠、戈壁、雅丹和盐滩,向北、东过渡到荒漠和荒漠草原,向

西与中亚地区荒漠相连,向南和西南过渡到青藏高原高寒荒漠、荒漠草原和高寒草原;纬度地带分异反映的是温度和降雨的双重效应,由北向南依次是中温带北部草原化荒漠(阿尔泰山北麓、东阿拉善北部)、中温带荒漠(准噶尔盆地和阿拉善高平原大部)、中温性高原荒漠(柴达木盆地)和暖温带荒漠(塔里木盆地)。

具体来说,西北干旱区以荒漠为主要植被类型,建群种主要是超旱生的小半乔木、半灌木、小半灌木和灌木。荒漠占据除阿尔泰山南麓和东阿拉善北部外的几乎所有盆地的沙地、冲积平原、宽广台地、山前洪积扇和前山与低山区,在昆仑山甚至达到北坡的中山带,以及昆仑内部山地与昆仑主脊以南高原谷地的高山带。草原、灌丛、森林和各类草甸植被等主要分布在降雨量较多的山地和径流水分积聚的荒漠区河流两侧、扇缘水分溢出带与湖泊周围低洼地。

山地植被垂直带结构与基带的地带性植被密切相关,同样具有明显的地域分异。垂直带的基带除了在阿尔泰山西南麓为荒漠草原外,在其余的地方均为荒漠,在新疆境内昆仑山南麓的高原山地垂直带也有以高寒荒漠为基带的;垂直带谱结构在不同的山地以及同一山地的不同区域间差异显著,有的带谱丰富,结构相对完整,而有的却相对简单,因气候的极度干旱而缺失了许多相对湿润的植被带或仅有相对破碎的不连续带。伊犁谷地山地和阿尔泰山垂直带属于前者,中、东昆仑山的垂直带可为后者的代表。垂直带谱组成由下向上在伊犁谷地的那拉提山为荒漠-草原-落叶阔叶林-针叶林-亚高山灌丛草甸-高山草甸-含垫状植物的冰缘稀疏植被-冰雪,在阿尔泰山为草原-针叶林-亚高山灌丛草甸-高山草甸-冻原-冰雪。在昆仑山,西段尚有断断续续的雪岭云杉(*Picea schrenkiana*)和圆柏林(*Sabina* spp.)呈带状分布,叶城以东基本只保留了很少量的圆柏,再向东到皮山以东圆柏消失,到民丰一带亚高山草甸也几乎看不到了;外围山地与内部山地的垂直带结构差异显著,反映出山地迎风坡相对湿润,如昆仑山北坡相对湿润,西段北坡尚有森林分布,而内部谷地极为干燥,在昆仑山南坡和塔什库尔干谷地荒漠甚至上升到 4 000 m 左右。在天山北坡和山口向西的伊犁谷地山坡均很湿润,有很好的森林分布,在南坡和东部的天山内部盆地则极为干燥;山地垂直带结构与山地抬升的速度也有一定的关系,在低缓山坡的迎风坡因气流抬升的水汽凝结效率有限,所形成的降水区域范围大,所以比较干燥,而高峻山地气流可

以迅速抬升,并将所携带的水分大量地释放在相对较小的区域内,所以比较湿润。在昆仑山,策勒的奴尔一带山地就比其东、西附近的山地相对湿润,中山带发育了很好的草原带和草甸带,其中的部分原因就与这一带山地陡峻,南面有高大的雪山有关,而民丰和且末一带却相对干燥。

土壤的形成与气候条件和地质地貌存在密切关系,平原与山地的土壤明显不同,区域之间也存在明显的差异。总的来说,平原区气候干燥,荒漠植物稀疏,主要发育了各种类型的荒漠土、风沙土,地带性荒漠土壤主要是温带的灰棕漠土和水分条件略好的灰漠土、暖温带的棕漠土。在盆地周边的一些倾斜平原上部和剥蚀高平原上,地表物质组成常以砾石为主,发育了砾质荒漠土和戈壁。在准噶尔北部额尔齐斯河与乌伦古河流域和天山北麓以及其它地方山地垂直带中分布有棕钙土,伊犁河谷山前丘陵与倾斜平原发育灰钙土。另外,在山地垂直带上还不同程度地发育着栗钙土、黑钙土、灰褐色森林土(天山、准噶尔西部山地、西昆仑山、祁连山、贺兰山)、灰色森林土(阿尔泰山)、亚高山草甸土、高山草甸土、高山草原土(昆仑山、阿尔金山)、高山荒漠土(昆仑山)以及冰沼土(阿尔泰山)等。

1.1.4 土地利用与产业发展方向

优化生态生产范式(Optimized eco-productive paradigm)是本着可持续发展与优化生态管理原则,按照生态系统特点组织的土地利用与产业发展趋向的方案。在地区的生态区划中充分反映范式与产业发展方向是本区划的最大特色(张新时,2001)。

西北干旱区自然生态系统受人类活动的强烈影响,特别是在植被生产力相对较高的山地森林生态系统、山地草原生态系统以及倾斜平原下部、扇缘带和荒漠河岸两侧地下水相对丰富地区的绿洲生态系统。人类对山地森林生态系统的影响主要是大量地砍伐和相对不足的造林,造成了森林资源的不断减少。山地草原和草甸主要受过度放牧的影响,导致物种组成发生变化,植被生产力下降,严重影响到区域可持续发展。盆地天然绿洲受到人类活动的影响主要是大量开垦农地和水资源的过度开发,导致原本滋养天然绿洲的水分大量分流到人工绿洲,许多常年河断流,甚至国内最大的内流河塔里木河下游300多公里断流,塔河上游多条支流汇集到塔河干流的水分不断减少,以致多条支流的河水多年来都消失在原来的河道,河水不再与塔河相连。河水的大量开发还导致地下水位不断下降、湖泊的萎缩

甚至干枯,如罗布泊、居延海、艾丁湖、艾比湖、玛纳斯湖等,进而依靠地下水的大量绿洲优势植物的生存受到严重影响甚至大面积消亡。另外,对矿产资源的开发也一定程度上影响了生态环境。

鉴于目前土地不合理利用产生的这些生态问题,在优化生态生产范式中必须把山盆系统各圈与带的生态特点和功能作为进行生态建设与可持续农业发展的重要参考依据。山地是荒漠盆地的水源,其高山冰雪夏季消融与山地降水是荒漠盆地的河流与地下水的主要水源。山地森林带也往往处在山地最大降水带或之下,具有重要的水源涵养、水文调节与水土保持作用,也是生物多样性最丰富和生物生产力较高的生态系统。高山草甸和山地草原也都含有比荒漠更多的物种组成和较高的生产力,是重要的放牧场。所以,山地圈的功能主要是水源涵养、生物多样性保育和合理负载的夏秋放牧场。山前倾斜平原上部通常为砾石堆积而成,地表为风蚀残余的砾幕或沙石,河水出山后多在此处迅速下渗,潜水位也很深,一般不宜开垦。山前倾斜平原中部土壤条件得到改善,地下潜水也较高,适合农垦,也是古老灌溉绿洲的主要所在地。山前倾斜平原下部的扇缘带是绿洲与荒漠之间的过渡带,因潜水接近地表、土质粘重而普遍发生盐渍化,或因绿洲灌溉余水与开垦耕地而发生次生盐渍化,生长一些耐盐的植物,成为绿洲前沿防风阻沙的重要生态屏障和放牧地。改造这些盐渍化的土地,种植具有一定耐盐碱能力的优质牧草,发展舍施畜牧业,既具有发展经济的直接利益,也具有保护绿洲生态环境的意义。古老冲积平原圈主要是荒漠和沙漠,部分土壤条件好,又有充足水源保证的地方也开垦为农地,但因地下水位较高而发生次生盐渍化的现象很普遍,准噶尔盆地的沙漠主要为固定或半固定沙丘,其它地方的沙漠多为流动性沙丘,都不宜进行农业生产和放牧。所以,古老冲积平原圈的生态功能定位是以环境保护和生物多样性保育为主,在条件优越的地段,比如水分充足的条件下可适当开发。具体来说,在准噶尔盆地沙漠可以建立一个整体的国家自然保护区或荒漠公园。

1.2 生态区划方法

本生态区划是以经验判别和地理信息系统(GIS)相结合进行的,过去发表的多种尺度的图件和区划方案均作为分区过程的辅助材料和新区划方案的校正材料,比如:中国植被图、中国地形图、中国土壤图、中国气候区划、综合自然地理区划、中国土地

利用图、中国陆地卫星假红外彩色图集、新疆植被图、新疆地形图、新疆地貌图等。

1.3 生态区划指标体系

指标体系是划分生态区的理论依据,尽管其随区划对象、区划尺度、区划目的和区划制订者思路的不同而改变,但任何一个指标体系的确定和各个指标的选取都尽可能地体现区划的目的并反映其区域分异规律。根据气候、巨地形系统、地貌、基质、植被、土壤以及土地利用和产业发展方向等特征,本生态区划的 3 级分区指标如下:一级分区,主要依据气候和巨地形系统,并充分考虑该高级分区在生态环境建设和产业结构调整中的作用;二级分区,主要根据次级地形和地貌系统以及大尺度植被类型;三级分区,主要依据基质和土壤的差异所造成的局域植被类型的差异,以及其生态-生产范式和将来的发展方向。

2 西北干旱区生态区划等级系统

根据以上区划的原则和指标体系,西北干旱区的生态区划采用 3 级区划制:生态域(Ecodomain)、生态区(Ecoregion)、生态小区(Ecodistrict)。

生态域:区划等级的高级单元,它是由气候的巨地形系统交互作用的大区域,以地表类型的显著差异为特征。其命名方法为:气候类型-巨地形系统-大产业发展方向。

生态区:区划等级的二级单元,独特的大地表类型或区域地表类型的集合,中尺度气候、植被、土壤、水文、人类活动等的交互作用,它是大尺度的生态地域与小尺度的生态地带之间的桥梁。其命名方法为:大地理位置-次级地形地貌系统-地带性植被类型。

生态小区:区划等级的三级单元,是相对均一的生物地理和气候特征控制的小尺度地区,如区域地表类型、局地地表类型、地形地貌、土壤和质地等级、水体、植被、土地利用分类、产业发展方向等决定的小区。其命名方法为:小地理位置-小地形地貌类型-基质和土壤类型-产业发展方向和生态环境保育方向。

由此,采用自上而下逐级划分、专家集成和 GIS 模型定量结合的方法,我们将西北干旱区划分为 3 个生态域、23 个生态区和 80 个生态小区,其比例尺为 1:100 万,生态区划的示意图见图 1。

3 西北干旱区生态区划特色、应用与问题

本生态区划的特色在于,基于西北干旱区的生

态地域分异规律和社会经济发展特点,充分考虑当地的生态环境建设和生态-生产范式与产业发展方向调整,在认识自然规律、理解自然规律的基础上提出利用自然规律指导当地的生态环境保育和农林畜牧产业结构调整的基本规则,由此可保证西部大开发过程中兼顾生态保护和经济建设,尽量使两者合理搭配,协调发展,达到西北干旱区可持续发展的目的。

该区划方案可应用于进行区域尺度的生态评估和生态环境监测网络的建立,多尺度的生态规划,以及不同地域和地区生态-生产范式的建立及其产业结构调整等方面。

然而,需要强调的是,最近几十年来西北干旱区人类活动不断加剧,土地利用的格局在时空两个尺度上都有较大的变化,比如在 20 世纪 90 年代,西北干旱与绿洲农业区传统绿洲边缘部分土地被开垦为耕地,同时绿洲内部原有耕地因土地退化而撂荒(刘纪远等,2003),加上其它的一些自然和人为干扰,如河流改道、大型工程建设等,势必会影响到某些生态区域的划分和分区界线的变动。目前,引额尔齐斯河河水到克拉玛依、到乌鲁木齐的引水工程正在进行之中,待水资源在人工工程的干预下发生重大的重新分配后,生态环境也会有所改变,相应的区域生态功能也会发生一些变化。本区划目前没有对此做更多的考虑,仍然是自然状态下的情况。

在西北干旱区生态区划的过程中,也存在一定的问题。一些生态类型如绿洲的地理分布是离散的,不是聚合的,但为了达到区划的目的,我们根据经验对它们进行了边界处理,使其连成区和片;而一些分布偏远的特殊地貌类型,如克拉玛依的雅丹地貌,很难与大的地貌类型连接成片,所以在区划时没有考虑在内;另外,一些类型的边界很难区分,如塔克拉玛干沙漠西北缘的冲积平原和扇缘带,目前基本上是混合在一起的,其边界的划分只能根据经验进行判定。

正如在引言中所强调的,生态区划的目的不仅仅是生态区的划分,而是在于利用生态分区指导当地的生态环境保育和产业结构调整,促进西北干旱区的可持续发展。因此,进一步的工作需要集中在某些关键生态区域的生态功能的分区与产业结构的调整以及生态-生产范式的建立和实践,比如天山北坡的“山盆系统”结构与功能的优化配置,建立“绿桥系统”即“山地-绿洲-绿洲/荒漠过渡带-荒漠生态-生产范式”作为新疆天山北部山盆系统生态保育、环境

西北干旱区生态区划图
The Ecoregion Map of the Northwestern Arid Land in China

图例 Legend

- 荒漠生态域 Desert Ecodomain
- 洪积扇生态域 Alluvial fan Ecodomain
- 山地生态域 Mountain Ecodomain

建设和农业结构调整的一个模式(张新时,2001),指导干旱地区生态环境建设和可持续发展,将会对保障天山北部山盆系统的生态安全,实施发展天山北

坡经济带的战略决策,促进新疆地区社会、经济和环境的可持续发展,维护边疆社会安定具有重要的意义。

←

图 1 中国西北干旱区生态区划概图

Fig.1 Sketch map of the ecological regionalization of northwestern arid land in China

- I 温带荒漠盆地自然保育生态域
- I-1 准噶尔盆地温带荒漠生态区

I-1-a 准噶尔北部砾质荒漠生态小区

I-1-b 艾比湖盐沼和壤质荒漠生态小区

I-1-c 古尔班通古特沙漠生态小区

I-1-d 准噶尔南缘壤质荒漠生态小区

I-1-e 准噶尔东部砾质荒漠生态小区
- I-2 伊犁谷地温带沙漠生态区

I-2-a 伊犁谷地沙漠生态小区
- I-3 河西走廊/阿拉善高原温带荒漠生态区

I-3-a 阿拉善西部戈壁荒漠生态小区

I-3-b 阿拉善北部砾质荒漠生态小区

I-3-c 阿拉善沙漠生态小区

I-3-d 河西壤质荒漠生态小区

I-3-e 黑河下游荒漠河岸林生态小区
- I-4 吐哈盆地暖温带荒漠生态区

I-4-a 吐哈盆地砾质荒漠生态小区
- I-5 塔里木盆地暖温带荒漠生态区

I-5-a 塔里木北部壤质荒漠生态小区

I-5-b 塔克拉玛干沙漠和田河西部生态小区

I-5-c 塔克拉玛干沙漠中部生态小区

I-5-d 塔克拉玛干沙漠塔里木河东部生态小区

I-5-e 塔里木西南部壤质荒漠生态小区

I-5-f 塔里木东南部壤质荒漠生态小区

I-5-g 塔里木东部壤质荒漠生态小区

I-5-h 罗布戈壁雅丹与盐漠生态小区

I-5-i 库木塔格沙漠生态小区

I-5-j 塔里木河河岸林生态小区

I-5-k 塔里木盆地和田河河岸林生态小区

I-5-l 塔里木盆地克里雅河河岸林生态小区

I-5-m 塔里木盆地车尔臣河河岸林生态小区
- I-6 柴达木盆地冷温带荒漠生态区

I-6-a 柴达木北部砾质荒漠生态小区

I-6-b 柴达木雅丹与沙漠生态小区

I-6-c 柴达木南缘盐沼生态小区
- II 温带洪积扇缘农林畜牧绿洲生态域
- II-1 阿尔泰山南麓山前洪积扇生态区

II-1-a 阿尔泰山南麓河谷与绿洲复合生态小区
- II-2 塔城盆地洪积扇生态区

II-2-a 塔城盆地边缘潜水分养生态小区

II-2-b 塔城盆地荒漠与绿洲复合生态小区
- II-3 天山北麓山前洪积扇生态区

II-3-a 天山北麓砾石戈壁潜水分养生态小区

II-3-b 天山北麓山前绿洲与扇缘潜水分带复合生态小区
- II-4 伊犁谷地洪积扇生态区

II-4-a 伊犁谷地砾石戈壁潜水分养生态小区

II-4-b 伊犁谷地绿洲与扇缘潜水分带复合生态小区

II-4-c 伊犁谷地河谷绿洲生态小区
- II-5 吐哈(东疆)山前洪积扇生态区

II-5-a 吐哈砾石戈壁潜水分养生态小区

II-5-b 吐鲁番山前绿洲生态小区

II-5-c 吐鲁番扇缘潜水分带生态小区

II-5-d 哈密山前绿洲生态小区

II-5-e 哈密扇缘潜水分带生态小区
- II-6 天山南麓山前洪积扇生态区

II-6-a 天山南麓砾石戈壁潜水分养生态小区

II-6-b 天山南麓山前砾石戈壁潜水分养生态小区

II-6-c 天山南麓山前绿洲与扇缘潜水分带复合生态小区
- II-7 河西(祁连山北麓)山前洪积扇生态区

II-7-a 河西山前砾石戈壁潜水分养与绿洲复合生态小区

II-7-b 河西山前绿洲与扇缘潜水分带复合生态小区

II-7-c 疏勒河河谷盐沼荒漠生态小区
- II-8 昆仑山前洪积扇生态区

II-8-a 昆仑山北麓砾石戈壁潜水分养生态小区

II-8-b 昆仑山北麓山前绿洲生态小区

II-8-c 昆仑山北麓扇缘潜水分带生态小区
- II-9 柴达木(东昆仑山北麓)山前洪积扇生态区

II-9-a 柴达木砾石戈壁潜水分养生态小区

II-9-b 柴达木山前绿洲与扇缘潜水分带复合生态小区
- II-10 贺兰山西麓水源涵养生态区

II-10-a 贺兰山西麓水源涵养生态小区
- III 温带山地森林-草原/荒漠休养恢复生态域
- III-1 阿尔泰山地森林-草原生态区

III-1-a 阿尔泰山高山冻原生态小区

III-1-b 阿尔泰山高山草甸-草原生态小区

III-1-c 阿尔泰山中山森林-草原生态小区

III-1-d 阿尔泰低山荒漠草原生态小区
- III-2 准噶尔西部山地森林-草原生态区

III-2-a 准噶尔西部高山草甸生态小区

III-2-b 准噶尔西部中山森林-草原生态小区

III-2-c 准噶尔西部低山荒漠草原生态小区
- III-3 天山北坡山地森林-草原生态区

III-3-a 北天山北坡高山草甸生态小区

III-3-b 南天山北坡高山草甸生态小区

III-3-c 天山北坡中山森林-草原生态小区

III-3-d 天山北坡低山荒漠生态小区

III-3-e 特克斯河谷草原生态小区
- III-4 天山南坡山地草原生态区

III-4-a 北天山南坡高山草甸生态小区

III-4-b 南天山南坡高山草甸生态小区

III-4-c 天山南坡中山灌丛-草原复合生态小区

III-4-d 尤尔都斯盆地草原生态小区

III-4-e 天山南坡低山荒漠生态小区
- III-5 昆仑山地荒漠生态区

III-5-a 昆仑山高山湖盆高寒荒漠、草原与草甸生态小区

III-5-b 昆仑山北坡中山草原生态小区

III-5-c 昆仑山北坡中山森林-草原生态小区

III-5-d 昆仑山北坡低山荒漠生态小区

III-5-e 阿尔金山北坡低山荒漠生态小区
- III-6 祁连山北坡山地森林-草原生态区

III-6-a 祁连山北坡高山草甸-草原生态小区

III-6-b 祁连山北坡中山森林-草原生态小区

III-6-c 祁连山北坡低山荒漠生态小区
- III-7 贺兰山西坡山地森林-草原生态区

III-7-a 贺兰山西坡中山森林-草原生态小区

III-7-b 贺兰山西坡低山荒漠生态小区

参 考 文 献

- Bailey RG (1980). *Description of the Ecoregions of the United States*. United States Department of Agriculture, Washington, DC, 77.
- Bailey RG (1983). Delineation of ecosystem regions. *Environmental Management*, 7, 365 – 373.
- Bailey RG (1984). Testing an ecosystem regionalization. *Journal of Environmental Management*, 19, 239 – 248.
- Bailey RG (1985). The factor of scale in ecosystem mapping. *Environmental Management*, 9, 271 – 276.
- Bailey RG (1987). Suggested hierarchy of criteria for multi-scale ecosystem mapping. *Landscape and Urban Planning*, 14, 313 – 319.
- Bailey RG (1989). Explanatory supplement to ecoregions map of the continents. *Environmental Conservation*, 16, 307 – 309.
- Bailey RG (1991). Design of ecological networks for monitoring global change. *Environmental Conservation*, 18, 173 – 175.
- Bailey RG (1996a). *Ecosystem Geography*. Springer-Verlag, New York, 216.
- Bailey RG (1996b). Multi-scale ecosystem analysis. *Environmental Monitoring and Assessment*, 39, 21 – 24.
- Bailey RG (1998a). *Ecoregions Map of North America: Explanatory Note*. United States Department of Agriculture, Washington, DC, 10.
- Bailey RG (1998b). *Ecoregions: the Ecosystem Geography of the Ocean and Continents*. Springer-Verlag, New York, 192.
- Bailey RG, Hogg HC (1986). A world ecoregions map for resource reporting. *Environmental Conservation*, 13, 195 – 202.
- Bailey RG, Zoltai SC, Wiken EB (1985). Ecological regionalization in Canada and the United States. *Geoforum*, 116, 265 – 275.
- Banner A, Meidinger DV, Lea EC, Maxwell RE, von Sacken BC (1996). Ecosystem mapping methods for British Columbia. *Environmental Monitoring and Assessment*, 39, 97 – 117.
- Bashkin VN, Bailey RG (1993). Revision of map of ecoregions of the world (1992-95). *Environmental Conservation*, 20, 75 – 76.
- Committee of National Agricultural Resource Survey and Agricultural Regionalization (全国农业自然资源调查和农业区划委员会) (1980). *Outline of Comprehensive Physical Regionalization in China* (中国综合自然区划纲要). Science Press, Beijing. (in Chinese)
- ECOMAP (1993). *National Hierarchical Framework of Ecological Units*. United States Department of Agriculture, Forest Service, Washington, DC, 20.
- Editorial Committee for Vegetation of China (中国植被编辑委员会) (1980). *Vegetation of China* (中国植被). Science Press, Beijing. (in Chinese)
- Fu BJ (傅伯杰), Liu GH (刘国华), Chen LD (陈利顶), Ma KM (马克明), Li JR (李俊然) (2001). Scheme of ecological regionalization in China. *Acta Ecologica Sinica* (生态学报), 21, 1 – 6. (in Chinese with English abstract)
- Hanson DS, Hargrave B (1996). Development of a multilevel ecological classification system for the State of Minnesota. *Environmental Monitoring and Assessment*, 39, 75 – 84.
- Holdridge LR (1967). *Life Zone Ecology*. Tropical Science Center, San Jose, 206.
- Hou XY (侯学煜) (1988a). Physical ecoregion of China and mega-agricultural development (I). *Bulletin of Chinese Academy of Sciences* (中国科学院院刊), (1), 28 – 37. (in Chinese)
- Hou XY (侯学煜) (1988b). Physical ecoregion of China and mega-agricultural development (II). *Bulletin of Chinese Academy of Sciences* (中国科学院院刊), (2), 137 – 152. (in Chinese)
- Hou XY (侯学煜), Sun SZ (孙世洲), Zhang JW (张经纬), He MG (何妙光), Wang YF (王义凤), Kong DZ (孔德珍), Wang SQ (王绍庆) (1982). *Vegetation Map of the People's Republic of China* (1: 4 000 000) (中国植被图). China Cartographic Publishing House, Beijing. (in Chinese)
- Huang BW (黄秉维) (1959). A draft scheme of comprehensive physical regionalization in China. *Chinese Science Bulletin* (科学通报), 18, 594 – 602. (in Chinese)
- Huang BW (黄秉维) (1989a). Retrospect and perspective of climate division and physical geographical regionalization in China. *Geographical Symposium* (地理集刊), 21, 1 – 9. (in Chinese)
- Huang BW (黄秉维) (1989b). Outline of comprehensive physical geographic regionalization in China. *Geographical Symposium* (地理集刊), 21, 10 – 20. (in Chinese)
- Li W (李万) (1982). A preliminary study of landscape regionalization in China. *Acta Geographica Scientica* (地理科学), 2, 358 – 367. (in Chinese with English abstract)
- Liu JY (刘纪远), Zhang ZX (张增祥), Zhuang DF (庄大方), Wang YM (王一谋), Zhou WC (周万村), Zhang SW (张树文), Li RD (李仁东), Jiang N (江南), Wu SX (吴世新) (2003). A study on the spatial-temporal dynamic changes of land-use and driving forces analysis of China in the 1990s. *Geographical Research* (地理研究), 22, 1 – 12. (in Chinese with English abstract)
- Matthews E (1983). Global vegetation and land use: new high-resolution data bases for climate studies. *Journal of Climate and Applied Meteorology*, 22, 474 – 487.
- Ni J (2001). A biome classification of China based on plant functional types and the BIOME3 model. *Folia Geobotanica*, 36, 113 – 129.
- Ni J (倪健) (2001). Plant functional types and biomes of China at a regional scale. *Acta Botanica Sinica* (植物学报), 43, 419 – 425. (in Chinese with English abstract)
- Ni J (倪健), Chen ZX (陈仲新), Dong M (董鸣), Chen XD (陈旭东), Zhang XS (张新时) (1998). An ecogeographical regionalization for biodiversity in China. *Acta Botanica Sinica* (植物学报), 40, 370 – 382. (in Chinese with English abstract)
- Ni SX (1985). A preliminary review of research on the physio-

- graphic regionalization of china. *Area*, 17, 19 – 24.
- Olson DM, Dinerstein E, Wikramanayake ED, Burgess ND, Powell GVN, Underwood EC, D'Amico JA, Itoua I, Strand HE, Morrison JC, Loucks CJ, Allnutt TF, Ricketts TH, Kura Y, Lamoreux JF, Wettengel WW, Hedao P, Kassem KR (2001). Terrestrial ecoregions of the world: a new map of life on earth. *BioScience*, 51, 933 – 938.
- Olson JS, Watts JA, Allison LJ (1985). *Major World Ecosystem Complexes Ranked by Carbon in Live Vegetation: a Database*. Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge.
- Pojar J, Klinka K, Meidinger DV (1987). Biogeoclimatic ecosystem classification in British Columbia. *Forest Ecology and Management*, 22, 119 – 154.
- Qiu BJ (丘宝剑), Lu QY (卢其尧) (1987). *Agricultural Climate Regionalization and its Methods* (农业气候区划及其方法). Science Press, Beijing. (in Chinese)
- Ren ME (任美镔) (1979). *Outline of Physical Geography in China* (中国自然地理纲要). Commercial Press, Beijing. (in Chinese)
- Rowe JS (1996). Land classification and ecosystem classification. *Environmental Monitoring and Assessment*, 39, 11 – 20.
- Rowe JS, Sheard JS (1981). Ecological land classification: a survey approach. *Environmental Management*, 5, 451 – 464.
- Schultz J (1995). *The Ecozones of the World: the Ecological Divisions of the Geosphere*. Springer-Verlag, Berlin, 5 – 71.
- Sims RA, Corns GW, Klinka K (1996). Global to local: ecological land classification. *Environmental Monitoring and Assessment*, 39, 1 – 10.
- Team of Xinjiang Comprehensive Scientific Survey and Institute of Botany, the Chinese Academy of Sciences (中国科学院新疆综合考察队和中国科学院植物研究所) (1978). *Vegetation of Xinjiang and Its Use* (新疆植被及其利用). Xinjiang People's Press, Urumqi. (in Chinese)
- Udvardy MDF (1975). *A Classification of the Biogeographical Provinces of the World*. IUCN, Morges.
- Wiken EB (1986). *Terrestrial Ecozones of Canada*. Environment Canada, Hull, 26.
- Wiken EB, Rubec CDA, Ironside G (1993). *Canada Terrestrial Ecoregions* (1:7.5 million scale). Environment Canada, Ottawa.
- Yang QY (杨勤业), Zheng D (郑度), Wu SH (吴绍洪) (2002). Study on ecogeographical regionalization system in China. *Advance in Natural Sciences* (自然科学进展), 12, 287 – 291. (in Chinese)
- Zhang XS (张新时) (2001). Ecological restoration and sustainable agricultural paradigm of mountain-oasis-ecotone-desert system in the north of the Tianshan Mountains. *Acta Botanica Sinica* (植物学报), 43, 1294 – 1299. (in Chinese with English abstract)
- Zhao SQ (赵松乔) (1983). A new scheme of comprehensive physical geographical regionalization of China. *Acta Geographica Sinica* (地理学报), 38, 1 – 10. (in Chinese with English abstract)
- Zheng D (郑度) (1999). *Physical Geography of the Karakorum Mountains and Kunlun Mountains* (喀喇昆仑山-昆仑山地区自然地理). Science Press, Beijing. (in Chinese)
- Zhu ZY (朱宗元), Liang CZ (梁存柱), Wang W (王炜), Liu ZL (刘钟龄) (2000). Landscape ecological regionalization in desert area of Alxa. *Resource and Environment of Arid Land* (干旱区资源与环境), 14, 37 – 48. (in Chinese with English abstract)

责任编辑: 傅伯杰 责任编辑: 姜联合